

Oliveira, L.M. *A influência do diabetes melito na doença periodontal*. Taubaté, 2000. 116 p., Dissertação (mestrado) – Universidade de Taubaté.

### **Resumo**

O Diabetes melito é considerado um importante fator de risco para a doença periodontal, estando o grau de controle metabólico (nível de hemoglobina glicosilada), duração da doença e ocorrência de complicações sistêmicas relacionadas com a presença e a intensidade da doença periodontal. O objetivo deste estudo foi avaliar os diferentes parâmetros clínicos periodontal segundo o grau de controle metabólico de pacientes diabéticos tipo 2. Vinte e três pacientes de serviços públicos e privados de São José dos Campos, SP, com idades entre 39 e 71 anos foram classificados de acordo com o nível de hemoglobina glicosilada em dois grupos: bom controle e precário controle metabólico. Os seguintes parâmetros clínicos foram analisados nestes pacientes: índices gengival, de placa e de sangramento à sondagem, profundidade de sondagem e nível clínico de inserção. Os resultados obtidos demonstraram não existir diferenças estatísticas significativas entre dois grupos, no entanto, do ponto de vista clínico, o grupo precário controle apresentou maior intensidade da doença periodontal mediante os parâmetros clínicos avaliados.

**Palavras chave:** Diabetes melito; doença periodontal; hemoglobina glicosilada